

# 维生素C泡腾片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

- 【药品名称】**通用名称：维生素C泡腾片  
英文名称：Vitamin C Effervescent Tablets  
汉语拼音：Weishengsu C Paoteng Pian
- 【成份】**本品每片含主要成份维生素C 0.5克。辅料为玉米淀粉，乳糖，碳酸氢钠，无水枸橼酸，阿司帕坦，核黄素磷酸钠，二氧化硅，富马酸，桔味香精，聚维酮K30。
- 【性状】**本品为白色或着色片，片面可有散在的着色小点。
- 【作用类别】**本品为维生素类非处方药药品。
- 【适应症】**1.增强机体抵抗力，用于预防和治疗各种急、慢性传染性疾病或其他疾病。  
2.用于病后恢复期，创伤愈合期及过敏性疾病的辅助治疗。  
3.用于预防和治疗坏血病。
- 【规格】**0.5克
- 【用法用量】**用温水或冷水溶解后服用，溶解后成为一杯鲜甜美味的饮品。  
成人，一日1-2片，一日内服用不得超过2片；儿童一日1片。
- 【不良反应】**1.长期服用每日2-3克可引起停药后坏血病，故宜逐渐减量停药。  
2.长期应用大量维生素C可引起尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结晶。  
3.过量服用（每日用量1克以上）可引起腹泻、皮肤红而亮、头痛、尿频（每日用量600毫克以上）、恶心呕吐、胃痉挛。
- 【禁忌】**尚不明确。
- 【注意事项】**1.不宜长期过量服用本品，否则，突然停药有可能出现坏血病症状。  
2.本品可通过胎盘并分泌入乳汁。孕妇服用过量时，可诱发新生儿产生坏血病。  
3.下列情况应慎用：（1）半胱氨酸尿症（2）痛风（3）高草酸盐尿症（4）草酸盐沉积症（5）尿酸盐性肾结石（6）葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（7）血色病（8）铁粒幼细胞性贫血或地中海贫血（9）镰形红细胞贫血（10）糖尿病（因维生素C干扰血糖定量）。  
4.如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。  
5.儿童必须在成人监护下使用。  
6.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。  
7.本品性状发生改变时禁止使用。  
8.请将本品放在儿童不能接触的地方。  
9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 【药物相互作用】**1.口服大剂量维生素C可干扰抗凝药的抗凝效果。  
2.与巴比妥或扑米酮等合用，可促使维生素C的排泄增加。  
3.纤维素磷酸钠可促使维生素C代谢为草酸盐。  
4.长期或大量应用维生素C时，能干扰双硫仑对乙醇的作用。  
5.水杨酸类能增加维生素C的排泄。  
6.如与其他药物同时使用可能发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
- 【药理作用】**本品参与机体内抗体及胶原形成，组织修补（包括某些氧化还原作用），苯丙氨酸、酪氨酸、叶酸的代谢，铁、碳水化合物的利用，脂肪、蛋白质的合成，以及维持免疫功能，羟化5-羟色胺，保持血管的完整，并促进非血红素铁的吸收。
- 【贮藏】**遮光，密封保存。
- 【包装】**铝管或塑料管包装。15片/管，1管/盒。
- 【有效期】**24个月。
- 【执行标准】**《中国药典》2020年版二部
- 【批准文号】**国药准字H20044176
- 【说明书修订日期】**2020年12月01日
- 【上市许可持有人】**名称：正大制药（青岛）有限公司  
注册地址：青岛经济技术开发区团结路3601号
- 【生产企业】**企业名称：正大制药（青岛）有限公司  
生产地址：青岛经济技术开发区团结路3601号  
邮政编码：266426  
电话号码：400-080-0001  
网 址：www.cppqd.com  
邮 箱：zdzyqd@cppqd.com  
如有问题可与生产企业联系

